

CEFALEXINA KUALCOS

SUSPENSIÓN

USO VETERINARIO / VENTA BAJO RECETA / USO EN PERROS Y GATOS / INDUSTRIA ARGENTINA

Polvo para preparar 50 ml de suspensión

Fórmula:

Cefalexina Monohidrato*3,160 g
Excipientes c.s.p.....25 g
*equivalente a Cefalexina base 3 g

Indicaciones de uso:

Antibiótico de amplio espectro, activo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la Cefalexina, incluso contra cepas de *Stafilococcus aureus*, resistentes a las penicilinas. Indicado principalmente en infecciones de: tracto génito urinario, vías respiratorias, tejidos osteoarticulares, oído medio, piel y tejidos blandos, glándulas mamarias y vías biliares.

Bacterias susceptibles

Gram Positivos: *Stafilococcus Aureus*, *Streptococcus Pyógenes*, *Viridans* y *Pneumoniae*.

Gram Negativos: *Neisseria*, *E. Coli*, *Proteus Mirabilis*, *Klebsiella Pneumoniae*, *Clostridium Perfringens*.

Preparación del producto para ser administrado:

Al frasco conteniendo los 25 g de polvo, agregarle agua potable hasta la flecha impresa, agitar bien y de esta forma quedan preparados 50 ml de suspensión lista para ser administrada. Cada ml de suspensión contiene 60 mg de Cefalexina base.

Vía de administración:

El producto se administra por vía oral.

Dosis en caninos y felinos:

1 ml de suspensión cada 2 kg de peso cada 12 hs.

Precauciones:

Una vez reconstituido, conservar hasta 7 días en heladera (entre 4° y 8°C)

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

El efecto colateral más grave está representado por las reacciones de hipersensibilidad, estas pueden ser leves o llegar a reacción anafiláctica grave. Se han mencionado casos de nefrotoxicidad, el cual se incrementa en caso de combinar a la Cefalexina con antibióticos aminoglucósicos. No administrar a pacientes con insuficiencia renal.

Se han descrito también casos de leves náuseas, vómitos y diarrea. Los valores de S.G.O.T. y S.G.P.T. y de fosfatasa alcalina pueden verse aumentados, pero estas elevaciones son transitorias y desaparecen al suspender el tratamiento.

No administrar a pacientes con antecedentes de anafilaxia a las penicilinas y a las cefalosporinas.

Presentación:

Estuche conteniendo 1 frasco con 25 g de polvo para preparar 50 ml de suspensión.

Mantener fuera del alcance de los niños

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 - 333 - 0160

Conservar entre 0° y 25° C

 SENASA Certificado N°: 02-058
Establecimiento Elaborador: KUALCOS S.R.L. N° 8468

Kualcos S.R.L - Emilio Zola 7845 José León Suárez - CP: 1655
Buenos Aires - Argentina
Te: + 54 - 11 - 4720 - 7774 / 7775 / 7776
www.kualcos.com - kualcos@dacas.com.ar

Director Técnico: Dr. Ariel M. Waisman
Farmacéutico - Matrícula Nacional N°: 11.782

Bolivia Importado por: Importadora Representaciones I.I.P. REG. CR-EMP N° 03-0008/6 REG. SENASAG PUV N° - Guatemala: Agrozona Guatemala S.A. REG. N° - Panamá: Agrocampo Panamá S. A. REG.: - Paraguay: Bienestar Animal S.A. REG. SENACSA N°: 14014 - Costa Rica: Agrocampo S.A. REG.; - Honduras: Agrocal S. A. REG.: - Ecuador: Farcovetsa S. A. REG.: - Uruguay Importa y Distribuye: Multivet S.R.L REG. N°: 2018A00650

KUALCOS
LABORATORIOS